

云南省林下经济适宜品种推荐目录（2026 年）

序号	物种 中文名	品种名称	良种编号	种苗繁育 基础	品种特性	适宜种植区域	选育单位	备注
1	砂仁	云砂8号砂仁优良无性系	云R-SC-AVILL-111-2023	有	以晚花特性达到抗性目的，壮苗基本不发生叶枯病。叶披针形，无毛；叶舌半圆形；蒴果近球形。盛产期鲜果产量459kg/亩，干果产量76.5kg/亩；挥发油含量4.5%，乙酸龙脑酯含量1.90%，超过药典标准50%以上。	适宜云南省勐腊县海拔500-1200m，年均温19-22℃，年均降雨量≥1200mm，≥10℃活动积温6000-7000℃区域及周边相似条件地区种植。	中国医学科学院药用植物研究所云南分所	
2	滇重楼	家春1号滇重楼优良家系	云R-SF-PP0-107-2023	有	6年生植株株高27-162cm；根茎顶芽周围萌生2-5个不定芽；叶片长椭圆披针形；萼片披针形，花瓣与萼片近等长，雄蕊3轮，花柱基黄色。6年生平均亩产鲜药材2100kg，重楼皂苷总含量2.2%。	适宜海拔1500-2000m，年均降雨量≥1200mm，年均温14-18℃，≥10℃区域及周边相似条件地区种植。	腾冲市农业技术推广中心	已被列入云南省农业农村厅推介发布2026年云南省农业主导品种
3	滇重楼	保重2号滇重楼优良家系	云S-SF-PP0-010-2020	有	7年生植株平均高1.6m，根状茎易萌生不定芽，叶倒卵形，先端急尖；果实扁球形，外种皮红色。移栽5年鲜药材产量1500kg/亩，重楼总皂苷超1.5%。	适宜云南省龙陵县、芒市和福贡县，海拔1200-1900m，年均温16-19℃，年降雨量≥900mm，≥10℃年活动积温≥3500℃区域及周边相似条件地区种植。	云南虎恩中药材种植有限公司	
4	滇黄精	保精1号滇黄精优良无性系	云S-SC-PKi-008-2020	有	植株平均高2.6m，叶轮生，披针形；花黄绿色，圆筒状，花梗长，雄蕊着生于花被筒上部；花期5月中旬，果期9-11月。移栽3年鲜药材产量4780kg/亩，黄精多糖8.7%。	适宜云南龙陵县、芒市和福贡县，海拔1400-2000m，年均温15-18℃，年降雨量≥900mm，≥10℃年活动积温≥3000℃区域及周边相似条件地区种植。	龙陵县石斛研究所	
5	滇黄精	林韵1号滇黄精优良无性系	云S-SC-PKi-007-2023	有	叶狭披针形，先端反卷；花冠筒状，白色。林下种植4年平均亩产鲜药材约5600kg，黄精多糖含量近8%。	适宜云南省海拔1900-2500m，年均温≥10℃，年均降雨量800-1000mm，≥10℃年活动积温≥3500℃区域及周边相似条件地区种植。	大理市林韵生物技术开发有限责任公司	
6	白及	绿源1号白及优良家系	云R-SF-BS-087-2024	有	植株长势强。叶披针形，花淡紫色，蒴果紫黑色。种植4年鲜药材平均产量6800kg/亩，其1，4-二〔4-（葡萄糖氧）苄基〕-2-异丁基苹果酸酯含量2.90%。	适宜大理市、巍山县海拔1800-2400m，年均温12-16℃，年降雨量800-1100mm，≥10℃年活动积温≥3000-5000℃区域及周边相似条件地区种植。	巍山彝族回族自治县绿源林果有限责任公司	
7	当归	滇归2号当归优良家系	云R-SF-AS-023-2025	有	平均株高46.9cm，茎淡紫色，叶柄紫色，叶脉紫色。平均亩产鲜药材1387kg，阿魏酸含量0.187%。	适宜玉龙县海拔2500-3200m，年均温7-11℃，年降雨量800-1000mm，≥10℃年活动积温≥2000℃区域及周边相似条件地区种植。	云南农业大学	
8	紫皮石斛	龙紫1号紫皮石斛优良无性系	云S-SC-DD-003-2018	有	植株粗壮，叶鞘密布紫红色条纹。花期4-5月，唇瓣基部两侧各具1个橙色斑块。盛产期茎长80-100cm，平均最大茎径10-12mm。以干物质计，鲜条多糖含量48.9%、甘露糖含量40.9%、纤维含量17.2%。亩产鲜条800kg。生物量大，适合加工石斛枫斗。	适宜云南省西南部、东南部海拔1400-2000m，年均温14-18℃，年降雨量≥1300mm，≥10℃年活动积温≥4000℃区域及周边相似条件地区种植。	龙陵县林业局林业产业工作站	

序号	物种 中文名	品种名称	良种编号	种苗繁育 基础	品种特性	适宜种植区域	选育单位	备注
9	独蒜兰	宝芸	云R-SV-PBU-109-2023	有	假鳞茎乳白色，阳光照射后变绿色，卵状圆锥形；叶椭圆状披针形；花淡紫色，花苞片较大，萼片离生；唇瓣明显大于萼片，上部撕裂状，基部囊状，具2条纵褶片，褶片具深紫色与白色相间斑纹。单个假鳞茎鲜重4.5-6.2g，4a生鲜药材亩产量420kg。假鳞茎折干率20.29%，主要有效成分dactylorhin A、militarine、batatasinIII含量分别为：0.6667%、1.417%、0.6274%。	适宜昭通市鲁甸县海拔1800-3200m，年均温8-14℃，年降雨量700-1000mm，≥10℃活动积温≥2500℃区域及周边相似条件地区种植。	昭通市林木种苗工作站	
10	川贝母	天泉3号川贝母优良家系	云R-SF-FC-056-2022	有	叶披针形，最下部叶对生，中上部叶互生或对生，先端卷曲；叶状苞片3枚；花黄绿色，有紫色方格和斑点；蜜腺窝背面明显凸出。4a亩产鲜鳞茎400kg，成品西贝母碱含量0.058%。	适宜香格里拉市海拔3000-4000m，年均温5.5-7.0℃，年降雨量700-1000mm，≥10℃年活动积温1500-2500℃区域及周边相似条件地区种植。	云南天泉生物科技股份有限公司	
11	姜黄	爱尼山1号姜黄优良无性系	云R-SC-CLO-110-2023	有	根断面橙黄色。叶片椭圆形，顶端短渐尖。穗状花序圆柱状，苞片卵形，淡绿色，顶端钝，上部无花的较狭，顶端尖；花萼白色，花冠淡黄色。抗病性强，2a年平均亩产鲜药材4100kg，挥发油含量19.5%，姜黄素含量1.86%。	适宜云南省楚雄彝族自治州双柏县海拔800-1500m，年均温15-20℃，年降雨量≥800mm，≥10℃年活动积温≥4500℃区域及周边相似地区种植。	云南省农业科学院药用植物研究所	
12	金佛山方竹	小草坝方竹	云R-SV-CU-063-2022	有	秆径3.5-8.5cm，幼秆具紫褐色条纹；秆基部节气根发达，幼秆表面密被白色绒毛；笋壳红褐色，斑点少，笋径达4.5-8cm，蛋白质含量2.5g/100g。年产笋500kg/亩。	适宜海拔1200-2100m，年均温12-14℃，年降雨量≥1000mm，≥10℃年活动积温≥3500℃区域及周边相似条件地区种植。	彝良县林业和草原局	
13	箬竹	大关1号箬竹优良无性系	云R-SC-CTU-050-2024	有	秆高6-7m，胸径1.8-2.2cm，节间长度21.90cm，尖削度0.40，秆环与节间直径比值1.86，壁厚率51.61%，1.3m以下竹节密度5-6节/100cm。竹笋盛产期年产量7560kg/hm ² 。粗纤维含量0.3g/100g，钙含量312mg/kg。	适宜大关县海拔1200-2100m，年均温9-12℃，年降雨量1000-1300mm，≥10℃年活动积温2800-4300℃区域及周边相似条件地区种植。	西南林业大学、大关县林业和草原局、大关县竹产业发展中心	
14	小粒种咖啡	德热6号	热品审2024004	有	树冠近圆柱形，树姿半开张，株高中等，果脐点状突出，种子长椭圆形，纵径1.63-1.96cm，横径1.34-1.55cm，侧径1.21-1.42cm。精品咖啡，杯测分数81.25-82.42分，风味突出，具有明显甜角风味。	适宜海拔800-1600m，年均温18.5-21℃，最冷月平均气温≥11.5℃，极端最低温>0℃，基本无霜，年降雨量≥1000mm区域及周边相似条件地区种植。	云南省德宏热带农业科学研究所	已被列入云南省农业农村厅推介发布2026年云南省农业主导品种
15	绣球	博大蓝	云S-SV-HM-012-2017	有	植株高40-70cm，茎中等粗，硬挺；叶对生，近椭圆形，宽8-11cm，长15-18cm，正反面均无毛；顶生伞房花序近球形，直径18-24cm，厚度纵径14-16cm，花萼片近椭圆形，随着土壤pH值的升高，其颜色由蓝色逐渐变为紫色，3年生植株平均单株产4-6枝，切花瓶插时间可达30-50天，抗病性强。	适宜阳宗海、元江、泸西海拔800-1850m，年均温≥15℃，年降雨量800-1000mm，≥10℃年活动积温≥4600℃及其相似地区种植。	昆明杨月季园艺有限责任公司	

云南省林草植物新品种推荐目录（2026 年）

序号	品种名称	所属属（种）	品种权号	品种权人	品种特性	适用范围	培育人	风险提示
1	保油 12 号	山茶属	20240773	腾冲市沙坝国有林场、保山市林业和草原技术推广站	从腾冲红花油茶自然杂交后代中选优获得。树体中等大小，树冠自然圆头形，直立，侧枝发达，幼龄期枝条生长势中庸、直立性强；1 年生结果枝尾枝长 9.5-15.0cm；叶披针形，平均长 8.6cm、宽 3.3cm；花两性，花瓣 5 枚，紫红色，直径 6.7cm；果实 10 月上旬成熟，木质蒴果呈椭圆形、果形指数 1.17，3 室，果顶平，果皮着暗红色、有瘤状凸起。	适宜在滇西保山腾冲市、龙陵县及滇中西部海拔 1600-2300m，土层深厚、排水良好的微酸性山地红壤、黄壤区域种植。	刘加理、杨晓霞、黄佳聪、李碧琳、罗存贞、赵江萍、杨晏平、张仁斌、周娟、黄艳芬	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
2	秋红	余甘子属	20230130	中国林业科学院热带林业研究所、保山市林业和草原技术推广站	从云南余甘子自然杂交后代中获得。3 年龄砧木嫁接后第 2 年结果，第 3 年进入初产期；幼树期生长势中庸，发育枝数量多而平直，树姿较开张；小枝、叶绿色中透红色或稍偏红色。一年生结果母枝平均抽生结果枝 8-7 个，脱落性结果枝平均结果 1.9 个、最多 6 个，每芽节平均抽生结果枝 1.6 个；平均单果重 14.7g，果实横径 2.75cm、纵径 2.70cm、果形指数 0.98；外果皮肉质，红褐色，可溶性固形物含量 13.2%。最显著的特点是树体中等大小，生长势中庸，早实；幼果阳面浅红色、果面着色时间较晚，秋季着色成熟后，果实阳面呈红色。	适宜在云南干热河谷海拔 300-1500m，年平均气温 16-24℃，年降雨量≥500mm，≥10℃活动积温≥4000℃，土层厚度≥50cm 的微酸性壤土种植。	郭俊杰、黄佳聪、罗存贞、杨晏平、曾杰、李碧琳、吴建花	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
3	高原 1 号	澳洲坚果	20251336	中国林业科学研究院高原林业研究所、普洱果尚农业科技有限公司、云南康源生态农业发展有限公司	从云南普洱江城澳洲坚果果园发现的变异株选育获得。树体中等，树姿开张，分枝能力强，生长势强；抗病虫能力强。早实、丰产、稳产，出籽率高达 56.6%。连续结果能力强；坐果率高，以结果枝中下部结果为主，每果枝结果 4.5 个。大树换接苗 1-2 年开花结实，5-8 年进入丰产期。	适宜在云南普洱市和临沧市等海拔 800-1700m，年平均气温 17-23℃，年降水量≥800mm，土层厚度≥50cm 的偏酸性壤土及相近的山地气候类型地区种植。	赵杰军、吴疆肿、尚瑞广、苏建荣、王丽娟、张建云、钱信君、姚利忠	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
4	华丽	花椒属	20220492	丽江市林业科学研究所、华坪县林业和草原局	从栽培群体中选择变异竹叶花椒单株，经无性繁殖培育而成。树姿开张，树势强，分枝能力强，树皮深灰色，枝条皮刺少或无，每 10cm 小枝不超过 3 枚，芽体饱满；叶 3-5 片，顶叶发达，无叶刺，叶缘锯齿疏；果穗长 8-12cm，果柄短，平均每穗着生果粒 83 粒，果实成熟呈圆形，密生疣状腺点，油腺大而饱满，颗粒均匀饱满，果皮厚、麻味纯正，气味浓郁。抗干旱贫瘠、抗病虫害能力强。	适宜在丽江市海拔≤2000m，年均温 12-20℃，沙壤土、中壤土，年降雨量 600-1000mm，≥10℃活动积温≥4000℃地区及周边相似区域种植。	高云贵、李庆华、彭吉光、王洪艳、关云琳、杨志刚、王晓燕、马琴、洪献梅、丁德品、杨根林、子桂才、谭凤琼、王益琴、胡佳蓂	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。

序号	品种名称	所属属(种)	品种权号	品种权人	品种特性	适用范围	培育人	风险提示
5	三合黑方	方竹属	20250069	西南林业大学、国际竹藤中心、彝良县林业和草原局	从云南彝良县方竹属种植园发现的变异株选育获得。秆高 5-8m，直径 3-7cm，节间长 20-30cm；竹秆下部略呈四方形；秆环平或隆起；秆每节三分枝；秆中下部各节内具发达的气生根刺；笋箨红褐色，顶部颜色深，紫黑色，边缘绿色，主要分布于上部或中部；箨背面密被绿色或白色斑点或斑块，具均匀分布的纵肋；箨鞘迟落，短于节间；幼秆箨鞘背面红褐色；箨片锥状三角形，4-7cm；小枝具叶 1-3 枚，叶片披针形。笋期 8 月至 9 月中下旬。	适宜在亚热带季风气候，年均温 15℃，极端最低气温-5℃，最高气温 40℃，常年云雾，年均降水量 1100mm，土壤疏松、湿润，pH 值 5-7 的壤土地区栽培。	孙茂盛、高健、黎芸榜	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
6	流光溢彩	杜鹃属	20200094	中国科学院昆明植物研究所	通过人工杂交选育获得，其亲本为大白杜鹃和马缨杜鹃。常绿灌木，高约 2-3m；枝条粗壮，幼枝嫩绿色，被稀疏丛卷毛及少数腺体；老枝淡棕色，光滑无毛。叶革质，长圆形，长 7-12cm，宽 2-5cm。总状伞形花序，有花 4-10 朵，花序总轴长 1.5-3cm，花冠宽钟状漏斗形，长 3.5-5.5cm，冠径 3-5cm，红紫色，花冠筒 1/3 以上至花冠裂片具红色斑点，花冠裂片 6-7，裂片近于圆形，长 1.5-1.7cm，宽 2-2.2cm，顶端有凹缺。子房幼时绿色，密被腺体及硬毛，成熟时黄绿色，花期 4-5 月，果期 7-8 月。	适宜在云贵高原大部分区域，湿度 30-60%，富含有机质的腐殖土地区栽培。20%荫蔽度下生长优势明显。	马永鹏、张长芹、田晓玲、魏薇	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
7	春色浪漫	山茶属	20250311	中国科学院昆明植物研究所	通过人工杂交选育获得。直立灌木，叶椭圆形至卵形，黄绿色，叶片小；花朵稠密，清香，单瓣型，能结实，果球形。花期 12 月至翌年 2 月。株型紧凑直立，生长强健。抗性强，病虫害较少；既耐荫，也不惧阳光直晒；生长快，枝丛茂密，耐修剪；花量大，属束花型品种，盛花期时满树皆花，是做花篱或盆栽年宵花的好材料，同时也适宜庭园栽培、园林布景。	适宜在除迪庆州、德宏州、西双版纳州外云南大部分地区栽植。	沈云光，王仲朗，王新蕊，冯宝钧	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可
8	粉色佳人	羊蹄甲属	20220591	中国科学院西双版纳热带植物园	嘉兰羊蹄甲与十蕊羊蹄甲杂交选育形成的。小乔木，高 2-5 米，枝无毛，叶硬纸质，叶柄无毛，总状花序侧生或顶生，具 5-8 朵花，花瓣粉红色，花期 3-11 月，花期长，盛花期主要集中在 4-10 月，生长势旺盛。	适宜在福建、广东、广西和海南、云南南部地区等地栽植。	吴福川	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
9	君临金樽	叶子花属	20260263	云南为君开园林工程有限公司	从三角梅巴特种和光叶种的杂交后代群体中选择特异单株，经无性繁殖培育而成。结合了光叶品种舒展挺立的特点，花朵苞片形状改变了黄花品种大多数为圆形扭曲的形态。全枝着花，花黄色，苞片大且呈楔形。	适宜在热带、亚热带，最冷月平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ，湿润、阳光充足的区域地区栽培。	钱永康、徐鹏、黄志雄、英裕萍、葛异、何建娜	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。

序号	品种名称	所属属(种)	品种权号	品种权人	品种特性	适用范围	培育人	风险提示
10	紫玉	石斛属	20250274	云南省林业和草原科学院、龙陵县石斛研究所、云南相紫德康石斛开发有限公司	从野生紫皮石斛引种驯化得到的变异单株，经过连续多代诱导高芽扩繁后得到的无性系。茎皮和采收期茎横切面均呈深紫色(RHS2015 71A)，萼片背面有紫色条纹，鲜条榨汁后，呈明亮艳丽的紫红色，氧化速度慢。	适宜在海拔 1200-2000m，相对湿度 65-85%，年平均气温 15-21℃，极端最高气温≤32℃，极端最低气温≥0℃，无霜期≥200d 的地区栽培。	蒋宏、周莹、杨相德、周彬、廖勤昌、华梅、李能波、李丽梅、孔继君、沈定才、陈东平、赵雅婷	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
11	健壮安娜	绣球属	20250926	昆明南国山花园艺科技有限责任公司	从‘粉色安娜贝拉’的开放式自然授粉实生子代筛选获得。耐寒，可耐-30℃低温，与‘安娜贝拉’相比，茎秆更粗壮、抗倒伏性强，花球更大，可达 30cm。初开粉色，盛花期粉花饱满，秋色渐转绿色，一季三色，观赏价值高，盛花期与秋色期均可做切花生产。新枝开花，无需春化，管理简便。该品种可做盆花、切花、干花生产，还可做绣球花海栽培观赏。	适宜在华北、华东、华中、西南及华南大部分地区的露地栽培。	杨玉勇	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
12	淡妆	蔷薇属	20250184	云南省农业科学院花卉研究所	从‘254’品种栽培群体中发现的芽变单株，经扦插繁殖培育而成。切花品种，花色为淡紫色(RHS CC 85 D)，花径 7-9cm，重瓣型花瓣重叠形成碗状或圆球状花型，花俯视呈星形，花瓣边缘无反卷，花型保持性好，整体花姿雅致，色彩柔和，浅色系渐变色。植株少刺或无刺。对常见叶部病害具有较强的耐性或抗性，适应性好、产量高，设施栽培条件下花期集中、开花整齐度高，年单位面积产量可达 280-350 枝/m ² ，产业化推广潜力大。此外，该品种瓶插期极长，夏季可维持≥15 天，冬季可达 35 天，较传统品种(通常夏季 5-7 天、冬季 10-15 天)瓶插期延长 2-3 倍。	适宜在具备切花月季栽培设施的地区种植。	赵培飞，王继华，张颖，蔡艳飞，施自明，田敏，孙丹	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
13	醉梦佳人	蔷薇属	20260140	姚安云秀花卉有限公司、云南省农业科学院花卉研究所、云南云秀花卉有限公司	经杂交而得的切花月季品种。植株为直立窄灌木，株高 80-90cm，花枝长 70-80cm，属多头小花品种；重瓣盘状花型，花瓣 41-45 枚，花径 4.0-5.5cm，花色橙粉，瓣基柠檬黄色，瓣缘波浪中等、无反卷，萼片延伸弱，花托呈梨形。茎秆嫩绿色均匀、无皮刺；叶片深绿中等大小，小叶 3、5 枚，叶缘为单锯齿。植株长势旺盛，抗病性较强，仅易感染白粉病，年产花 20 枝/株，瓶插期 7-10 天。花型清新别致，多头开花观赏性佳，适配花艺配花、花艺设计、花束搭配等场景，适宜设施鲜切花栽培。	适宜在云南省亚热带、温带地区温室保护地栽培。	段云晟、王其刚、杨培娟、景维坤、谢芸、王志国、易光柱、段金辉、刘琳	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。

序号	品种名称	所属属(种)	品种权号	品种权人	品种特性	适用范围	培育人	风险提示
14	斯嘉丽	蔷薇属	20240020	云南锦科花卉工程研究中心有限公司	经杂交而得的切花月季品种。灰霉病、白粉病、霜霉病抗性强；产量可达180枝/年/m ² ，远高于同类型品种，成品花A/B级占比率可达60%以上，相较同环境和管理条件下的其他多头品种高10-20%；花朵直径为6-7cm，同类型品种花朵直径4-5cm，花色粉白色，浅色系品种。	适宜在滇中地区温度14-28℃，湿度60-85%，土壤pH值6.0-6.5，有机质丰富，疏松透气以及气候相近的地区栽培。	倪功、曹荣根、何琼、乔丽婷、田连通、阳明祥、王江兵	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。
15	摩朵	蔷薇属	20250340	开远市国家现代农业产业园管理委员会，云南种子种业联合实验室	杂交获得的切花月季新品种，以‘皇家波塞丽娜’为父本，‘DEBD-3’为母本。叶片浓绿，椭圆形，顶端小叶渐尖；枝长60-80cm，单个花枝上有5-8个花头，花头开花整齐；花色为柔和的紫粉色，低饱和度、清新淡雅；半重瓣花型，形似山茶花；花瓣从花心轻微向外反卷，花瓣边缘呈波浪形。“中国风系列”月季新品种，且具有淡雅的自然花香，与市面上主流的杯状月季有明显区别，花朵开放度好，盛开时能看见花朵中心明亮的黄色花蕊，与紫粉色的花瓣形成鲜明对比。生长旺盛，产量高。	适宜在具有滇中地区相似气候及设施条件的地区种植。	蔡艳飞、田敏、张志恒、赵培飞、杨颖婕、施自明、王继华、王开学、王雅平	除法定例外情形的繁殖、栽培等行为，须取得品种权人合法许可。